

## PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Caja con 8 y 12 tabletas

Logo

Rápido alivio del cólico menstrual intenso

ANALGEN FORTE<sup>®</sup>  
Naproxeno / Paracetamol  
220 mg /300mg  
Tabletas

- ) Rápido alivio del cólico menstrual
- ) Rápido alivio del cólico intenso
- ) Cólicos
- ) Desinflama y alivia el dolor

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Naproxeno Sódico	.....	220 mg
Paracetamol DC 90 equivalente a	.....	300 mg
Excipiente cbp	.....	1 tableta

INDICACIONES: Para el alivio del dolor en el cólico menstrual intenso y las molestias del síndrome premenstrual.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

 USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.

### CONTRAINDICACIONES:

Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado por personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.

Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse náusea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento con paracetamol: pérdida de peso, coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente el tratamiento. No tome paracetamol con mayor frecuencia de lo indicado.

### Interacciones medicamentosas y alimentarias:

El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona, dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o inyectados, insulina y medicamentos para el control del azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.

No se deje al alcance de los niños.

No exceda la dosis recomendada.

No usar por más de 5 días.

Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) y [farmacovigilancia@liomont.com.mx](mailto:farmacovigilancia@liomont.com.mx)

Lote.....

Caducidad....

Precio máximo al público:

Hecho por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.  
Adolfo López Mateos 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México

Para:

PHARMAGEN S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

Rápido alivio del cólico menstrual intenso

ANALGEN FORTE<sup>®</sup>  
Naproxeno - Paracetamol  
220 mg /300 mg  
Tabletas

- ) Rápido alivio del cólico menstrual
- ) Rápido alivio del cólico intenso
- ) Cólicos
- ) Desinflama y alivia el dolor

**FÓRMULA:**

Cada tableta contiene:

Naproxeno Sódico	.....	220 mg
Paracetamol DC 90 equivalente a	.....	300mg
Excipiente cbp	.....	1 tableta

**INDICACIONES:**

Para el alivio del dolor en el cólico menstrual intenso y las molestias del síndrome premenstrual.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:**

Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.

Adultos mayores de 65 años: Tomar 1 tableta cada 12 horas, no exceder de 2 tabletas al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.



**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No se use en embarazo ni en la lactancia.

**Contraindicaciones:** Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado por personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.

Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse náusea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento con paracetamol: pérdida de peso, coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente el tratamiento. No tome paracetamol con mayor frecuencia de lo indicado.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:**

El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona, dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o inyectados, insulina y medicamentos para el control del azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:**

En caso de sobredosis acuda inmediatamente con su médico.

No se deje al alcance de los niños.

No exceda la dosis recomendada.

No usar por más de 5 días.

Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) y [farmacovigilancia@liomont.com.mx](mailto:farmacovigilancia@liomont.com.mx)

Reg. No. 320M2003 SSA VI  
Lote..... Caducidad....  
Precio máximo al público:

Hecho por:  
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

Para:  
PHARMAGEN S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

---

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Caja con 12, 16, 20 ó 24 tabletas

Logo

Rápido alivio del dolor y la fiebre  
ANALGEN FORTE®

Naproxeno / Paracetamol  
220 mg /300 mg  
Tabletas

- ) El analgésico fuerte para dolor de:
  - ✓ Cabeza
  - ✓ Garganta
  - ✓ Oído
  - ✓ Muscular
  - ✓ Dental
- ) Baja la fiebre
- ) Desinflama y alivia el dolor

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Naproxeno Sódico	.....	220 mg
Paracetamol DC 90 equivalente a	.....	300mg
Excipiente cbp	.....	1 tableta

INDICACIONES:

Para el alivio del dolor de cabeza, fiebre presentes en padecimientos debiso a infecciones de vías respiratorias como gripe y resfriado común; dolor de oído, amigdalitis, dolor e inflamación músculos y articulaciones; dolor posterior a una cirugía o después del parto y dolor o inflamación dental.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.

Adultos mayores de 65 años: Tomar 1 tableta cada 12 horas, no exceder de 2 tabletas al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.



USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado por personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.

Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse nausea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento: pérdida de peso, coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente.

Interacciones medicamentosas y alimentarias: El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona, dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o inyectados, insulina y medicamentos para el control del azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis acuda inmediatamente con su médico.

No se deje al alcance de los niños.

No exceda la dosis recomendada.

No usar por más de 5 días.

Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) y [farmacovigilancia@liomont.com.mx](mailto:farmacovigilancia@liomont.com.mx)

Reg. No. 320M2003 SSA VI

Lote..... Caducidad....

Precio máximo al público:

Hecho por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

Para:

PHARMAGEN S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

## PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA Y/O CAJA E INSTRUCTIVO IMPRESO

Envase con 2 ó 4 tabletas

Logo

Rápido alivio del dolor y la fiebre

ANALGEN FORTE<sup>®</sup>

Naproxeno - Paracetamol

220 mg / 300 mg

Tabletas

) El analgésico fuerte para dolor de:

- ✓ Cabeza
- ✓ Garganta
- ✓ Oído
- ✓ Muscular
- ✓ Dental

) Baja la fiebre

) Desinflama y alivia el dolor

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Naproxeno Sódico	.....	220 mg
Paracetamol DC 90 equivalente a	.....	300mg
Excipiente cbp	.....	1 tableta

INDICACIONES: Para el alivio del dolor en el cólico menstrual intenso y las molestias del síndrome premenstrual.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Adultos y mayores de 12 años: Tomar 2 tabletas al inicio del tratamiento seguido de 1 tableta cada 8-12 horas mientras persistan dolor o inflamación. Población adulta no deberá ingerir más de 3 g de paracetamol al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.



USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en embarazo ni en la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: Personas alérgicas al naproxeno, paracetamol o a otros analgésicos o antiinflamatorios. No debe ser usado por personas con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No se use en menores de 12 años.

Reacciones secundarias y adversas: Pueden presentarse náusea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad. Se asocia a mayor riesgo gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos. Si usted presenta durante el tratamiento pérdida de peso, coloración amarillenta de piel y ojos, deberá acudir a su médico y suspender inmediatamente.

Interacciones medicamentosas y alimentarias: El uso de ANALGEN FORTE con otros medicamentos como: metilprednisolona, dexametasona; otros antiinflamatorios como nimesulida, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, diclofenaco y piroxicam, así como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y gastritis. Su uso junto con anticoagulantes orales o inyectados, insulina y medicamentos para el control del azúcar requiere vigilancia por su médico. El efecto de medicamentos usados para el tratamiento de la presión alta puede disminuir cuando se administran junto con Naproxeno/Paracetamol.

### INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis acuda inmediatamente con su médico.

No se deje al alcance de los niños.

No exceda la dosis recomendada.

No usar por más de 5 días.

Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) y [farmacovigilancia@liomont.com.mx](mailto:farmacovigilancia@liomont.com.mx)

Reg. No. 320M2003 SSA VI  
Lote..... Caducidad....  
Precio máximo al público:

Hecho por:  
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

Para:  
PHARMAGEN S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada



PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA

---

ALIVIA EL DOLOR Y LA FIEBRE

Logo

ANALGEN FORTE®  
Naproxeno / Paracetamol  
220 mg / 300 mg  
Tabletas  
Oral

Reg. No. 320M2003 SSA VI

Lote .....

Cad .....