

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con tubo de 30 g y 60 g

Logo

EFICAZ ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACION

ANALGEN®

Naproxeno  
10g/100g  
Gel

FORMULA- Cada 100 g contiene:  
Naproxeno ..... 10 g  
Excipiente cbp ..... 100 g

INDICACIONES: Eficaz alivio de la inflamación y dolores musculares causados por: golpes, torceduras, esguinces, desgarres. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Una aplicación 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica. Léase instructivo.

SU USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Queda bajo la responsabilidad del médico.

CONTRAINDICACIONES: Alergia al naproxeno y a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso prolongado puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada.  
Si persisten las molestias consulte a su médico.  
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.  
No se deje al alcance de los niños.

Reg. No. 549M98 SSA V Lote... Caducidad...  
Precio máximo al público:

Hecho por:  
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.  
Ética Farmacéutica desde 1938  
Adolfo López Mateos 68 Col.Cuajimalpa, C.P 05000,  
Del. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México

Para:  
PHARMAGEN S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos 68 Bis. Col. Cuajimalpa, C.P 05000,  
Del. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México

® Marca registrada

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA

---

Tubo de 30 g y 60 g

Logo

EFICAZ ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACION

**ANALGEN®**

Naproxeno

Gel

FORMULA- Cada 100 g contienen:  
Naproxeno ..... 10 g  
Excipiente cbp ..... 100 g

INDICACIONES: Eficaz alivio de la inflamación y dolores musculares causados por: golpes, torceduras, esguinces, desgarros. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Una aplicación 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica. Léase instructivo.

SU USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Queda bajo la responsabilidad del médico

CONTRAINDICACIONES: Alergia al naproxeno y a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso prolongado puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.

No se deje al alcance de los niños.

Reg. No. 549M98 SSA V Lote... Caducidad...

Hecho por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Ética Farmacéutica desde 1938

Adolfo López Mateos 68 Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,

Del. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.

Para:

PHARMAGEN S.A. de C.V.

Adolfo López Mateos 68 Bis. Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,

Del. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México

® Marca registrada

### Modo de empleo

Una aplicación 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba

1 Aplíquese directamente en la zona afectada



2 Frote suavemente



3 Permita su absorción durante unos minutos

