



LIOMONT

PROYECTO DE MARBETE

ANALGEN® NF
Naproxeno/Lidocaína
Gel

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con tubo con 30 g o 60 g

Logo

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN® NF
Naproxeno/ Lidocaína
Gel
10 g/5 g /100 g

FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Naproxeno	10.000 g
Clorhidrato de Lidocaína	5.000 g
Excipiente cbp	100.000 g

INDICACIONES: Eficaz alivio del dolor y la inflamación de origen muscular y articular como golpes, torceduras, esguinces, desgarres, distensión muscular en cuello, espalda alta y baja, así como traumatismos menores en tejidos blandos. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Aplicar de 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Cutáneo. No ingerible.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES: No usar Naproxeno/Lidocaína en personas alérgicas al naproxeno y/o a la lidocaína o a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIÁTRICO: No deberá usar Naproxeno/Lidocaína en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso prolongado de Naproxeno/Lidocaína puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

En caso de irritación de la piel, suspéndase de inmediato la aplicación de ANALGEN NF y consulte a su médico.

No exceda la dosis recomendada.

No se deje al alcance de los niños

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Este medicamento contiene color azul No. 1, el cual puede producir reacciones alérgicas.

Consérvese el tubo bien cerrado a no más de 30°C y en un lugar seco.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 045M2008 SSA VI

Lote... Caducidad...

Precio máximo al público:

Hecho en México por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,

Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada



LIOMONT

PROYECTO DE MARBETE

ANALGEN® NF
Naproxeno/Lidocaína
Gel

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA

Caja con tubo con 30 g o 60 g

Logo

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN® NF
Naproxeno/ Lidocaína
Gel
10 g/5 g /100 g

FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Naproxeno	10.000 g
Clorhidrato de Lidocaína	5.000 g
Excipiente cbp	100.000 g

INDICACIONES: Eficaz alivio del dolor y la inflamación de origen muscular y articular como golpes, torceduras, esguinces, desgarres, distensión muscular en cuello, espalda alta y baja, así como traumatismos menores en tejidos blandos. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Aplicar de 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Cutánea. No ingerible.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES: No usar Naproxeno/Lidocaína en personas alérgicas al naproxeno y/o a la lidocaína o a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIÁTRICO: No deberá usar Naproxeno/Lidocaína en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso prolongado de Naproxeno/Lidocaína puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

En caso de irritación excesiva de la piel suspenda de inmediato la aplicación de ANALGEN NF y consulte a su médico.

No exceda la dosis recomendada.

No se deje al alcance de los niños

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Este medicamento contiene color azul No. 1, el cual puede producir reacciones alérgicas.

Consérvese el tubo bien cerrado a no más de 30°C y en un lugar seco.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 045M2008 SSA VI

Lote... Caducidad...

Hecho en México por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,

Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada