

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 10, 12 ó 20 tabletas

Logo

ANALGEN®
Naproxeno Sódico
Tableta
220 mg

12 Hrs. de Alivio

* Desinflama y alivia el dolor

* Desinflama y alivia el dolor de articulaciones

* Dolor Muscular

* Alivio del Cólico Menstrual

FÓRMULA:

Cada Tableta contiene:

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| Naproxeno Sódico | | 220 mg |
| Excipiente cbp | | 1 tableta |

INDICACIONES:

ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual), muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras, desgarres, esguinces, distensiones, así como manipulaciones ortopédicas). También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral. **Adultos y mayores de 12 años:** Tomar 2 tabletas cada 12 horas. No tomar más de 4 tabletas al día.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:  No use naproxeno sódico durante el embarazo o lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la fórmula, a otro analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

Reacciones adversas: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle náusea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no tome naproxeno sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....
Precio máximo al público:

Hecho y distribuido en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México; México.

Para:
INNOVARE R&D, S.A. DE C.V.
Calle 2, No. 13 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México; México.

Para información relacionada con el producto, comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el enlace (link): [sitio Web](#)

® Marca registrada

PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA

Logo

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®

Naproxeno Sódico

Tableta

220 mg

Oral

Protéjase de la luz

Reg. Núm. 591M95 SSA VI

Lote....

Cad...

PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO

Frasco con 10, 12 ó 20 tabletas

Logo

ANALGEN®
Naproxeno Sódico
Tableta
220 mg

12 Hrs. de Alivio

* Desinflama y alivia el dolor

* Desinflama y alivia el dolor de articulaciones

* Dolor Muscular

* Alivio del Cólico Menstrual

FÓRMULA:

Cada Tableta contiene:

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| Naproxeno Sódico | | 220 mg |
| Excipiente cbp | | 1 tableta |

INDICACIONES:

ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual), muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras, desgarres, esguinces, distenciones, así como manipulaciones ortopédicas). También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral. **Adultos y mayores de 12 años:** Tomar 2 tabletas cada 12 horas. No tomar más de 4 tabletas al día.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA  No use naproxeno sódico durante el embarazo o lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la fórmula, a otro analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

Reacciones adversas: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle náusea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no tome naproxeno sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....

Hecho y distribuido en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México., México.

Para:
INNOVARE R&D, S.A. DE C.V.
Calle 2, No. 13 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México; México.

Para información relacionada con el producto
Comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el enlace (link): [sitio Web](#)

® Marca registrada

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 12 tabletas

Logo

ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®
Naproxeno Sódico
Tabletas
550 mg

24 hrs. de Alivio

Doble acción

- * Analgésico
- * Antiinflamatorio

Alivio de:
Dolor Muscular
Torceduras, desgarros
Traumatismos

FORMULACIÓN:

Cada Tableta contiene:

Naproxeno sódico 550 mg
Excipiente cbp 1 tableta

INDICACIONES:

ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual), muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras, desgarros, esguinces, distensiones, así como manipulaciones ortopédicas). También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral, **Adultos y mayores de 12 años:** Tomar 1 tableta cada 24 horas. Si el dolor es intenso tomar 1 tableta cada 12 hrs. No Tomar más de 2 tabletas al día.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:  No use naproxeno sódico durante el embarazo o lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la formula, a otro analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso pediátrico: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

Reacciones adversas: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle, dolor estomacal, dolor de cabeza, náusea, hinchazón de pies y manos, zumbido de oídos y mareos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no use naproxeno sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

No exceda la dosis recomendada.

Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....
Precio máximo al público:

Hecho y distribuido en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México., México.

Para:
INNOVARE R&D, S.A. DE C.V.
Calle 2, No. 13 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México; México.

Para información relacionada con el producto, comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el enlace (link): [sitio Web](#)

® Marca registrada

PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA

Logo

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®

Naproxeno Sódico

Tabletas

550 mg

Oral

Protéjase de la luz

Reg. Núm. 591M95 SSA VI

Lote....

Cad...