

PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO

Frasco con 20 g, 60 g, 85 g y 160 g

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

FORMULA- Cada 100 g contiene:
Ketoconazol 2 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.

DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al discontinuar su uso.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien tapado.

Reg. No. 338M96 SSA VI Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.

PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO
(Venta Libre al Público y Exportación)

Frasco con 20 g, 60 g, 85 g y 160 g

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo

Sport con aroma iceberg

Los médicos lo recomiendan

FORMULA- Cada 100 g contiene:
Ketoconazol 2 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.

DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al discontinuar su uso.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien tapado.

Reg. No. 338M96 SSA VI Lote... Caducidad...

Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.

® Marca registrada

Viñeta 01-800

Sitio Web

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 25, 50 y 100 Sobres

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

FORMULA- Cada sobre contiene:
Ketoconazol 0.02 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.

DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al discontinuar su uso.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien tapado.

Reg. No. 338M96 SSA VI Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 25, 50 y 100 Sobres

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

Sport con aroma iceberg

FORMULA- Cada sobre contiene:
Ketoconazol 0.02 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.

DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al discontinuar su uso.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien tapado.

Reg. No. 338M96 SSA VI Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.

Distribuido por:
Pharmagen, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68 bis. Col. Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, México, D.F.

PROYECTO DE MARBETE PARA SOBRE DE CELOPOLIAL
(Venta individual o en Caja Colectiva)

Sobre con 5 g

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

Sport con aroma iceberg

FORMULA- Cada sobre contiene:
Ketoconazol 0.02 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.

DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al discontinuar su uso.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien tapado.

Reg. No. 338M96 SSA VI Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.

® Marca registrada
Sitio Web

Viñeta 01-800

PROYECTO DE MARBETE PARA SOBRE DE CELOPOLIAL
(Venta individual o en Caja Colectiva)

Sobre con 5 g

Logo

PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE DE ATLETA

CONAZOL Talco®
Ketoconazol
Polvo
Los médicos lo recomiendan

FORMULA- Cada sobre contiene:
Ketoconazol 0.02 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. Para el tratamiento de las afecciones de la piel ocasionadas por hongos (pie de atleta y tiñas), manifestado por mal olor, ardor, sudoración excesiva, comezón y grietas cutáneas.

DOSIS: Aplíquese 2 ó 3 veces al día sobre la piel afectada, durante 15 días o hasta cinco días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE EMPLEO: Lave los pies con agua y jabón, secar perfectamente. Espolvoree la cantidad de talco suficiente para cubrir el área afectada, incluyendo los espacios entre los dedos, evitando que el polvo tenga contacto con los ojos o heridas abiertas. No es efectivo en uñas o piel cabelluda.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al ketoconazol.

USO PEDIATRICO: No usar en niños menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Puede producir sensación local de irritación leve que desaparece al discontinuar su uso.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Para uso externo exclusivamente. Evite el contacto con los ojos.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

Consérvese el frasco bien tapado.

Reg. No. 338M96 SSA VI Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.