

L-OMBRIX®
Mebendazol
Tabletas

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:

Cada tableta contiene:

Mebendazol	100 y 500 mg
Excipiente cbp	Una tableta

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Mebendazol es un antihelmíntico versátil particularmente contra nemátodos gastrointestinales en donde su acción es independiente de su concentración sistémica. Es eficaz contra la Ascariasis, la capilariasis intestinal, oxiuriasis, es de primera elección en la trichuriasis e infestación por *Ancylostoma duodenale* y *Necator americanus* (Estrongiloidiasis). Es efectivo en parasitosis simples o múltiples. El mebendazol es activo contra larvas y formas adultas de nematodos y, es ovicida para *Áscaris* y *Trichuris*. La inmovilización y muerte de los parásitos susceptibles es lenta y su desaparición de la luz intestinal puede tardar varios días después del tratamiento con mebendazol.

Mebendazol causa la desaparición de microtúbulos citoplásmicos en células intestinales y tegumentarias de los parásitos susceptibles, induce la acumulación de sustancias secretadas en el aparato de Golgi, impide la secreción de colinesterasa e inhibe de manera selectiva e irreversible la captación de glucosa y otros nutrientes, lo que causa la muerte de parásitos susceptibles que habitan el intestino. No afecta las células del huésped.

CONTRAINDICACIONES:

Mebendazol está contraindicado en las personas que han mostrado hipersensibilidad al compuesto activo, y en niños menores de 2 años. Embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES GENERALES:

Mebendazol puede causar mareo durante el tratamiento por lo que deberán extremarse las precauciones para conducir vehículos, manejar maquinaria o realizar actividades que requieran de precisión psicomotora. Puede ser necesario reducir la dosis en pacientes con insuficiencia hepática avanzada.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

No existe experiencia en el empleo de este medicamento durante el embarazo y lactancia por lo que su uso queda bajo la responsabilidad del médico; sin embargo, se le considera potencialmente embriotóxico y teratogénico. Evitar el embarazo un mes después de su administración.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Ocasionalmente dolor abdominal, diarrea, fiebre, prurito y urticaria en forma transitoria.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

Se ha reportado que el mebendazol aumenta la secreción de insulina por lo que su asociación con hipoglucemiantes orales puede potenciar su acción. Carbamazepina y fenitoina pueden aumentar el metabolismo de mebendazol y disminuir su efecto.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

Se han presentado efectos teratogénicos en perros, puercos y caballos; por lo que el beneficio potencial deberá justificar el posible riesgo.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Oral

Tabletas de 100 mg:

Oxiuriasis: una tableta administrada una sola vez. Se aconseja repetir una dosis (una tableta), después de un mes, para evitar una posible reinfestación.

Ascariasis, tricocefalosis, uncinariasis e infestaciones mixtas: 1 tableta, dos veces al día durante tres días consecutivos.

Strongiloidosis y Teniasis: 2 tabletas, 2 veces al día durante tres días.

Tabletas de 500 mg (Dosis Unica):

La dosis es una tableta de L-ombrix® tanto para adultos como para niños mayores de 2 años.

No se requiere dieta especial ni laxante.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):

No se han comunicado datos de sobredosificación con mebendazol. En caso de sobredosis es posible que ocurra un aumento en la incidencia de las reacciones secundarias descritas, en particular gastrointestinales y del efecto antabus.

PRESENTACIONES:

Caja con 6 tabletas de 100 mg y Caja con 1 tableta de 500 mg

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Evite el embarazo un mes después de haber terminado el tratamiento.

Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Si persisten las molestias consulte a su médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmcoviigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacoviigilancia@liomont.com.mx

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México

® Marca registrada

Reg. Núm. 86518 SSA VI